

Integrazione di 1-forme

DEFINIZIONE

Siano Ω un aperto di \mathbb{R}^n e $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ una curva. Sia

$$\alpha = \alpha_1(x) dx_1 + \alpha_2(x) dx_2 + \cdots + \alpha_n(x) dx_n$$

una 1-forma di classe C^0 su Ω .

Se γ è di classe C^1 , allora definiamo l'integrale di α su γ come

$$\int_{\gamma} \alpha = \int_a^b \alpha(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt,$$

dove \cdot è il prodotto scalare in \mathbb{R}^n e dove abbiamo identificato la forma α con il campo vettoriale

$$\alpha : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \alpha(x) = (\alpha_1(x), \alpha_2(x), \dots, \alpha_n(x)).$$

Se invece $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ è C^1 a tratti, allora definiamo

$$\int_{\gamma} \alpha = \sum_{j=1}^k \int_{t_{j-1}}^{t_j} \alpha(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt,$$

dove

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b$$

è una qualsiasi partizione di $[a, b]$ tale che $\gamma : [t_{j-1}, t_j] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è di classe $C^1([t_{j-1}, t_j])$ per ogni $j = 1, \dots, k$.

LINEARITÀ

Sia Ω un aperto in \mathbb{R}^n e siano α e β due 1-forme (di classe C^0) su Ω . Sia

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$$

una curva C^1 a tratti. Allora,

$$\int_{\gamma} (\alpha + \beta) = \int_{\gamma} \alpha + \int_{\gamma} \beta.$$

INTEGRAZIONE DI FORME SU CURVE CONCATENATE

Sia Ω un aperto in \mathbb{R}^n e sia α una 1-forma di classe C^0 su Ω . Siano

$$\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \Omega \quad \text{e} \quad \gamma_2 : [b, c] \rightarrow \Omega$$

due curve C^1 a tratti tali che

$$\gamma_1(b) = \gamma_2(b).$$

Allora,

$$\int_{\gamma_1 * \gamma_2} \alpha = \int_{\gamma_1} \alpha + \int_{\gamma_2} \alpha.$$

INTEGRAZIONE DI FORME SU CURVE INVERSE

Siano Ω un aperto in \mathbb{R}^n e α una 1-forma di classe C^1 su Ω . Se $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ è una curva C^1 a tratti e se

$$\gamma_- : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \gamma_-(t) = \gamma(a + b - t),$$

allora

$$\int_{\gamma_-} \alpha = - \int_{\gamma} \alpha.$$

 INTEGRAZIONE DI FORME SU CURVE EQUIVALENTI

Siano Ω un aperto in \mathbb{R}^n e α una 1-forma di classe C^0 su Ω . Supponiamo che le curve

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega \quad \text{e} \quad \sigma : [A, B] \rightarrow \Omega$$

siano equivalenti. Allora

$$\int_{\gamma} \alpha = \int_{\sigma} \alpha.$$

Infatti, se $g : [a, b] \rightarrow [A, B]$ è la funzione tale che $\gamma = \sigma \circ g$, allora

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \alpha &= \int_a^b \alpha(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt && \text{(per definizione)} \\ &= \int_a^b \alpha(\sigma(g(t))) \cdot \sigma'(g(t)) g'(t) dt \\ &= \int_A^B \alpha(\sigma(s)) \cdot \sigma'(s) ds && \text{(cambiamo variabile: } s = g(t), ds = g'(t) dt) \\ &= \int_{\sigma} \alpha && \text{(per definizione).} \end{aligned}$$

INTEGRAZIONE DI 1-FORME ESATTE

Teorema 1. Sia Ω un aperto di \mathbb{R}^d e sia α una 1-forma esatta in Ω ; precisamente, supponiamo che $\alpha = dF$, dove $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione di classe C^1 su Ω . Allora, per ogni curva C^1 $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$, abbiamo

$$\int_{\gamma} \alpha = \int_{\gamma} dF = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

Dimostrazione. Siccome $\alpha = dF$, il campo associato alla forma α è dato dal gradiente ∇F .

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \alpha &= \int_a^b \nabla F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt && \text{(per definizione)} \\ &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} [F(\gamma(t))] dt && \text{(per la formula della derivata di una funzione composta)} \\ &= F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) && \text{(per il teorema fondamentale del calcolo integrale).} \quad \square \end{aligned}$$

Corollario 2. Sia Ω un aperto di \mathbb{R}^d e sia α una 1-forma esatta in Ω ; precisamente, supponiamo che $\alpha = dF$, dove $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione di classe C^1 su Ω . Allora, per ogni curva C^1 a tratti $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$, abbiamo

$$\int_{\gamma} \alpha = \int_{\gamma} dF = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

Dimostrazione. Sia

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_k = b$$

una partizione di $[a, b]$ tale che

$$\gamma : [t_j, t_{j+1}] \rightarrow \Omega$$

sia di classe C^1 per ogni $j = 0, \dots, k-1$. Allora,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \alpha &= \sum_{j=0}^{k-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} \nabla F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} (F(\gamma(t_{j+1})) - F(\gamma(t_j))) = F(\gamma(t_k)) - F(\gamma(t_0)) = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)). \quad \square \end{aligned}$$

Corollario 3. Sia Ω un aperto di \mathbb{R}^d e sia α una 1-forma esatta in Ω .

Allora, per ogni curva chiusa e C^1 a tratti $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$, abbiamo che $\int_{\gamma} \alpha = 0$.